

犬各关节用量指南

Polyglycan® 关节新™



关注“百美达”
获取更多产品信息



Polyglycan® 关节新™ 犬类用量参考

关节 (单位mL*)	腕关节	肘关节	肩关节	髋关节	膝关节	后跗关节
迷你犬	0.1 - 0.3	0.2 - 0.5	0.5 - 0.7	0.5 - 0.7	0.5 - 0.7	0.2 - 0.5
小型犬	0.2 - 0.4	0.5 - 0.7	0.7 - 1.0	0.7 - 1.0	0.7 - 1.0	0.4 - 0.6
中型犬	0.4 - 0.6	0.6 - 0.8	0.8 - 1.0	0.8 - 1.0	0.8 - 1.0	0.5 - 0.7
大型犬	0.5 - 0.7	0.9 - 1.25	1.0 - 1.5	1.0 - 1.5	1.0 - 2.0	0.5 - 1.0
巨型犬	0.6 - 0.8	1.0 - 1.5	1.5 - 2.0	1.5 - 2.0	1.5 - 2.0	0.7 - 1.0

* 可以根据兽医的经验和患犬的体型，以此为参考酌情增减。详细信息参见背面。

该用量指南的目的是帮助兽医使用Polyglycan®关节新™。它是一种用于术后无菌灌洗、滑液置换或黏弹性补剂的兽用产品。

该指南由Paul Shealy博士（兽医学博士、理学硕士、DACVS）经长期临床实践研发，目的是为了**避免关节囊过度肿胀**，同时提供预期的疗效。

无法为所有患犬提供确切的统一标准。Polyglycan®关节新™的剂量与使用频率应该由兽医确定。

关节内注射Polyglycan®关节新™应始终遵循无菌注射技术。

使用前请阅读产品说明。

扫码右侧二维码，了解更多产品信息和查看Shealy博士演示的各种犬关节注射视频 →



*本产品由兽药经销商提供给持有执照的兽医