


DORACIDE® 必虫清™

【作用与用途】

抗寄生虫类药。用于治疗家畜线虫
虫病、血虱、螨病等外寄生虫病。



广谱驱虫

内外同驱，对蛔虫、线虫等体内寄生虫，疥螨、虱子等体外寄生虫均有很好的驱虫效果。



安全性高

孕畜可用；按推荐剂量使用无不良反应；对环境友好，对人体无任何伤害。



长效保护

药效持续18天以上，可以囊括寄生虫的整个生活史。



使用方便

单体给药，用量精准。可皮下/肌肉注射。

DORACIDE®

必虫清™



活性成分

1%多拉菌素注射液

药理作用

多拉菌素是由阿维链霉菌新菌株发酵产生的大环内酯类抗生素，是广谱抗寄生虫药，对体内外寄生虫特别是某些线虫（圆虫）类和节肢动物类具有良好的驱杀作用，但对绦虫，吸虫及原生动物无效。本品主要在于加强虫体的抑制性递质Y氨基丁酸的释放，从而阻断神经信号的传递，使肌肉细胞失去收缩能力，而导致虫体死亡。哺乳动物的外周神经递质为乙酰胆碱，不会受到多拉菌素的影响，多拉菌素不易透过血脑屏障，对动物有很高的安全系数。

适应症

用于治疗猪线虫病，螨病等外寄生虫病。用于动物的体内外驱虫。（仅供兽用）

用法用量

肌肉注射，可按每33kg体重注射本品1ml。

休药期

猪 56日

有效期

24个月



猪场如何使用必虫清™控制寄生虫：

1 全场所有的母猪和公猪一次注射必虫清™（一刀切）：

目的：净化种猪群，防止寄生虫传播给哺乳仔猪；

剂量：7ml/头母猪（母猪平均体重假定为220kg）；

次数：通常每年2次，严重的或之前未用过必虫清驱虫的，可以间隔一个月再使用一次，以后半年1次。

2 保育仔猪转到生长育肥舍时注射必虫清™：

目的：净化寄生虫。提高饲料利用率；

剂量：0.8ml（仔猪转群时假定体重为25kg）；

次数：一次注射，保护至出栏。

3 引进的种猪：

隔离期按体重注射必虫清™一次。



公司：百美达(中国)

网站：www.bimeda.cn/zh

地址：上海市普陀区武宁路19号丽晶阳光大厦2310室

电话：021-31263656

邮箱：cn-sales&marketing@bimeda.com

